




Patienten-Tagebuch

für die Therapie des
Restless-Legs-Syndroms

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit dem Pflaster verfügen Sie über ein Medikament, das seine Wirkung über die Haut entfaltet. Es muss nur **1 x täglich auf die Haut aufgebracht werden.**



Täglicher Pflasterwechsel – auf täglich wechselnder Hautpartie

In der nebenstehenden Abbildung sind die Körperstellen auf denen das Pflaster aufgeklebt wird, **farbig markiert.**

Um Ihnen die Anwendung so leicht wie möglich zu machen, sind die Klebestellen für das Pflaster mit Ziffern von 1 – 14 gekennzeichnet.

Unsere Empfehlung: Folgen Sie der Nummerierung im nebenstehenden Schema. Beginnen Sie am ersten Tag mit der Klebestelle 1. Verwenden Sie am folgenden Tag die Klebestelle 2 usw. Kleben Sie das Pflaster am 15. Tag wieder auf die Klebestelle 1. Sie können selbstverständlich auch Ihre eigene Klebe-Reihenfolge festlegen. Eine einmal beklebte Hautstelle sollten Sie erst nach 14 Tagen wieder bekleben.


Wichtig: Bitte kleben Sie das Pflaster nur auf trockene, gesunde und unverletzte Hautpartien.

Name des Patienten

Therapiebeginn

Name des Arztes

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.




Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

Wichtig: Drücken Sie das Pflaster für mindestens **30 Sekunden** mit der Handfläche fest auf die Haut. So stellen Sie sicher, dass die Klebefläche des Pflasters durch die Körperwärme aktiviert wird.



Dosierung (mg/24 h) _____

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	

	Körperstelle (1, 2 usw.)
Mo	
Di	
Mi	
Do	
Fr	
Sa	
So	



LegaPlus®

Einfach gut betreut – bei Parkinson und RLS.



Sie erreichen das LegaPlus®-Serviceteam gebührenfrei unter:

0800-70 70 70 6

Mo.–Fr. 8.00–18.00 Uhr

info@legaplus.de

(Arztstempel/Apothekenstempel)